

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПЕКТУСИН

Регистрационный номер: ЛС-001974

Торговое наименование: Пектусин

Международное непатентованное или группировочное наименование: эвкалипта шарикового листьев масло + [левоментол]

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания

Состав на одну таблетку:

Действующие вещества: левоментол (L-ментол) – 4,0 мг, эвкалипта шарикового листьев масло (эвкалиптовое масло) – ~~500,0~~ 5 мг;

вспомогательные вещества: сахароза (сахар белый) – 672,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая 101 – 50,0 мг, β-циклодекстрин – 40,0 мг, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы – 2,3 мг, тальк – 23,2 мг, кальция стеарат – 8,0 мг.

Описание:

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки белого с кремоватым оттенком цвета, с риской, с характерным запахом. На поверхности таблеток допускается мраморность и вкрапления темного или светлого цвета.

Фармакотерапевтическая группа:

противомикробное средство растительного происхождения.

Код АТХ: R07AX

Фармакологические свойства

Обладает слабым противомикробным и противовоспалительным действием.

Formatted: Russian

Formatted: Russian

Показания к применению

Препарат применяют в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 8 лет. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

С осторожностью

Сахарный диабет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

В связи с отсутствием опыта применения во время беременности и в период грудного вскармливания назначение препарата данной группе пациентов не рекомендовано.

Formatted: Not Highlight

Способ применения и дозы

Местно. Таблетки следует держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая.
Взрослым – по 1 таблетке 3-4 раза в день; детям старше 8 лет – по 1-2 таблетке в день.
Длительность лечения 5 дней.

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

В одной таблетке препарата содержится около 0,72 г углеводов, что соответствует 0,06 ХЕ.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания, 0,5 мг + 4,0 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из плёнки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается контурные ячейковые упаковки помещать в групповую упаковку с равным количеством инструкций по применению.

Условия хранения

При температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ОАО "Фармстандарт-Лексредства",

305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13,

www.pharmstd.ru

Производитель/организация, принимающая претензии

ОАО "Фармстандарт-Лексредства",

305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13,
www.pharmstd.ru

Представитель
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

Е.В. Толстова