

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

## МУКАЛТИН

**Регистрационный номер:** ЛС-001833

**Торговое наименование:** Мукалтин

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** алтея лекарственного травы экстракт

**Лекарственная форма:** таблетки

### **Состав на одну таблетку:**

активный компонент: алтея лекарственного травы экстракт (мукалтин) – 50,0 мг;  
вспомогательные вещества: винная кислота - 43,25 мг, кальция фосфат 2-замещенный безводный (кальция гидрофосфат безводный) - 179,75 мг, кросповидон (кросповидон CL-M) - 21,0 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский, повидон К 17) - 3,0 мг, кальция стеарат - 3,0 мг.

**Описание:** круглые плоскоцилиндрические таблетки от светло-серого до коричневатого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета, со специфическим запахом, с фаской и риской.

**Фармакотерапевтическая группа:** отхаркивающее средство растительного происхождения.

**Код АТХ:** [R05CA].

### **Фармакологические свойства**

Мукалтин представляет собой смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного, обладает отхаркивающими свойствами. Благодаря рефлекторной стимуляции усиливает активность мерцательного эпителия и перистальтику дыхательных бронхиол в сочетании с усилением секреции бронхиальных желез.

### **Показания к применению**

Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем и образованием трудноотделяемой мокроты повышенной вязкости (трахеобронхит, обструктивный бронхит, бронхоэктазы, пневмония и др.) - в составе комплексной терапии.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, детский возраст до 12 лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям от 12 лет внутрь 1-2 таблетки 2-3 раза в день перед едой. Курс лечения в среднем 7-14 дней. Детям можно растворить таблетку в 1/3 стакана тёплой воды.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции, редко - диспепсические явления.

### **Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Мукалтин можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний.

Мукалтин не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другими противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

### **Форма выпуска**

Таблетки, 50 мг.

По 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке из бумаги с полимерным покрытием или в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

2, 3, 5 или 10 контурных безъячейковых или контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Допускается контурные безъячейковые или контурные ячейковые упаковки с равным количеством инструкций по применению непосредственно помещать в групповую упаковку.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 15 °С и относительной влажности не более 60 %.  
Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/организация, принимающая претензии:**

Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Лексредства»  
(ОАО "Фармстандарт-Лексредства"), Россия,  
305022, Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18,  
тел./факс: (4712) 34-03-13, [www.pharmstd.ru](http://www.pharmstd.ru)

**Наименование и адрес предприятия-производителя:**

Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Лексредства»  
(ОАО "Фармстандарт-Лексредства"), Россия,  
Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18,  
тел./факс: (4712) 34-03-13, [www.pharmstd.ru](http://www.pharmstd.ru)