

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО  
ПРЕПАРАТА

Нафтизин

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Нафтизин.

**Международное непатентованное наименование:** нафазолин

**Лекарственная форма:** капли назальные.

**Состав на 1 мл:**

*Действующее вещество:* нафазолина нитрат - 0,5 мг или 1,0 мг.

*Вспомогательные вещества:* борная кислота - 20,0 мг, вода очищенная - до 1 мл.

**Описание:** прозрачная, бесцветная или с желтоватым опенком жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: противоконгестивное средство (альфаадреномиметик).

Код АТХ: R01AA08.

**Фармакологические свойства**

***Фармакодинамика***

Альфа-адреностимулирующее средство, оказывает быстрое, выраженное и продолжительное вазоконстрикторное действие в отношении сосудов слизистых оболочек (уменьшает отечность, гиперемию, экссудацию). Облегчает носовое дыхание при ринитах. Через 5-7 дней возникает толерантность.

***Фармакокинетика***

При местном применении системная абсорбция низкая.

**Показания к применению**

Острый ринит (в т. ч. на фоне острых респираторных заболеваний и аллергический ринит), синусит, евстахиит, ларингит, отек гортани аллергического генеза, отек гортани на фоне облучения, гиперемия слизистой оболочки после операций на верхних дыхательных путях. Для остановки носовых кровотечений.

**Противопоказания**

- повышенная чувствительность к нафазолину или любому из вспомогательных веществ,
- артериальная гипертензия,
- выраженный атеросклероз,

- тиреотоксикоз,
- тяжелые заболевания глаз, в том числе закрытоугольная глаукома,
- хронический ринит,
- атрофический ринит,
- сахарный диабет,
- тахикардия,
- одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы и в течение 14 дней после окончания их применения,
- для раствора 0,05 % - детский возраст младше 2 лет,
- для раствора 0,1 % - детский возраст младше 15 лет.

### **С осторожностью**

Ишемическая болезнь сердца (стенокардия), гиперплазия предстательной железы, феохромоцитомы, в период беременности и грудного вскармливания.

### **Применение при беременности и лактации:**

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

### **Способ применения и дозы**

Интраназально (в каждый носовой ход), взрослым и детям старше 15 лет назначают по 1-3 капли 0,05 % - 0,1 % раствора 3-4 раза в день.

У детей старше 2 лет применяют 0,05 % раствор (или 0,025 % раствор, разбавляя 0,05 % раствор дистиллированной водой):

от 2 до 6 лет - по 1-2 капли, от 6 до 15 лет - по 2 капли 1-3 раза в день.

Для диагностических целей - после очистки носа в каждый носовой проход закапать по 3-4 капли или ввести тампон, смоченный в 0,05 % растворе, и оставить на 1-2 мин; при отеке голосовых связок вводить малыми дозами гортанным шприцем; при кровотечениях - ввести тампон, смоченный 0,05 % раствором.

Применять кратковременно, но не более недели, не более 3-х дней у детей. Если носовое дыхание облегчается, то применение Нафтизина можно закончить раньше. Повторное применение препарата возможно через несколько дней.

Перед введением препарата следует тщательно очистить носовые проходы.

### **Побочные действия**

Жжение или сухость слизистой оболочки полости носа; чувство «заложенности» носа (реактивная гиперемия после прекращения воздействия препарата; набухание слизистой оболочки полости носа), тахикардия, повышение артериального давления.

головная боль, раздражительность. тошнота. аллергические реакции.

Длительное и частое применение нафазолина может привести к хроническому нарушению проходимости носовых ходов и атрофии слизистой оболочки носа (медикаментозный ринит).

### **Передозировка**

При передозировке препарата в результате системного воздействия на организм могут развиваться такие явления, как нервозность. повышенная потливость. головная боль. тремор, тахикардия, ощущение сердцебиения. повышение артериального давления.

К возможным признакам передозировки относятся также тошнота. цианоз, дыхательные и психические расстройства.

В случае угнетения центральной нервной системы наблюдается брадикардия. слабость, сонливость, снижение температуры тела, повышение потоотделения, коллапс. крайне редко возможно развитие комы.

Лечение: промывание желудка, прием активированного угля (при случайном попадании препарата внутрь): симптоматическое.

### **Взаимодействия с другими лекарственными средствами**

Не следует применять одновременно с ингибиторами моноаминоксидазы или в течение 14 дней после окончания их применения. Замедляет всасывание местноанестезирующих лекарственных средств (удлиняет их действие при проведении поверхностной анестезии).

### **Особые указания**

Может оказывать резорбтивное действие.

При длительном применении выраженность сосудосуживающего действия постепенно снижается (явление тахифилаксии), в связи, с чем рекомендуется через 5-7 дней применения сделать перерыв на несколько дней.

Ввиду возможного развития побочных явлений со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем не следует превышать дозы препарата Нафтизин, рекомендованные к применению.

Следует избегать попадания препарата в глаза.

Во избежание распространения инфекции необходимо применять препарат индивидуально.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

После длительного применения или приема средств от насморка, содержащих нафазолин в дозировках, превышающих рекомендуемые, нельзя исключать общее влияние на сердечно-сосудистую систему и центральную нервную систему. В этих случаях способность управлять транспортными средствами и движущимися механизмами может снижаться.

### **Форма выпуска**

Капли назальные, 0,05 % и 0,1%

По 10 мл или 15 мл во флаконы-капельницы полимерные с винтовой горловиной, пробкой-капельницей и навинчиваемой крышкой с контрольным кольцом первого вскрытия или во флаконы-капельницы полимерные с винтовой горловиной, насадкой-дозатором и навинчиваемой крышкой с контрольным кольцом первого вскрытия.

1 флакон-капельницу полимерный вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

### **Владелец регистрационного удостоверения**

ЗАО "ЛЕККО", Россия

601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 278.

### **Производитель/организация, принимающая претензии потребителей**

ЗАО "ЛЕККО", Россия

601125. Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский ул. Заводская, стр. 277;

601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 279,

тел./факс (49 243) 71 5 52