

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Ингалипт

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Ингалипт

Лекарственная форма: аэрозоль для местного применения

Состав на один балон

Действующее вещество:

сульфаниламид натрия – 0,750 г, сульфатиазола натрия пентагидрат – 0,750 г, тимол – 0,015 г, масло эвкалиптовое – 0,015 г, мяты перечной масло – 0,015 г.

Вспомогательные вещества: этанол (спирт этиловый) 95 % – 1,800 г, сахаринат натрия – 0,045 г, глицерол (глицерин) – 2,100 г, полисорбат-80 (твин-80) – 0,900 г, вода очищенная – до 30 мл, азот – от 0,3 до 0,4 г.

Описание: прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, находящаяся в баллоне с клапаном непрерывного действия под давлением сжатого газа. Препарат при выходе из баллона образует струю с характерным запахом тимола и ментола.

Фармакотерапевтическая группа: противомикробное комбинированное средство

Код АТХ: R02AA20

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат для местного применения при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и горла. Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и горла). Тимол, масло эвкалиптовое и мяты перечной масло оказывают противогрибковый (в отношении грибов рода *Candida*), противомикробный, противовоспалительный и легкий обезболивающий эффект.

Показания к применению

Тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный стоматит.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата; беременность, период грудного вскармливания; детский возраст до 3 лет

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение Ингалипта при беременности и в период грудного вскармливания. В состав препарата входят сульфаниламиды, способные проникать при местном применении через плаценту, обнаруживаются в крови плода. Возможно развитие тератогенного действия. При необходимости использования препарата в период лактации необходимо прекратить грудное вскармливание; проникает в грудное молоко, может вызвать ядерную желтуху у новорожденных.

Способ применения и дозы

Применяется местно. Сняв предохранительный колпачок с баллона, распыляют взвесь в полость рта 1-2 секунды.

Орошение проводится 3–4 раза в сутки с предварительным прополаскиванием рта кипяченой водой.

Побочное действие

Аллергические реакции, кратковременное ощущение жжения или першения в горле. При появлении побочных реакций необходимо отменить применение препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Признаки острого отравления при приеме внутрь: тошнота, рвота, боли в желудке.

Пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу.

Меры помощи при передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка, искусственная рвота, использование солевых слабительных, клизма, применение кишечных адсорбентов – активированного угля), симптоматическое лечение. При необходимости проводят оксигено- и трансфузионную терапию.


Особые указания

Применение препарата Ингалипт у детей возможно только по рекомендации врача!

Дети могут применять препарат с такого возраста, когда они не сопротивляются постороннему предмету (аппликатору) во рту при применении аэрозоля и способны задерживать дыхание при впрыскивании препарата.

Баллон не вскрывать и не нагревать.

Во время введения препарата баллон следует держать вертикально (см. рисунок)!



Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Данные о влиянии препарата на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций отсутствуют.

Форма выпуска

Аэрозоль для местного применения.

По 30 мл в баллоны аэрозольные алюминиевые моноблочные, снабженные клапанами непрерывного действия и предохранительными колпачками. Каждый баллон с распылителем и инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии потребителей

ОАО "Фармстандарт-Лексредства",

305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18,
Тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru