

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ПУСТЫРНИКА ЭКСТРАКТ

Регистрационный номер: ЛСР-002619/09

Торговое название: Пустырника экстракт

Лекарственная форма: таблетки

Состав на одну таблетку.

Пустырника экстракт сухой -14,0 мг.

Вспомогательные вещества: сахар (сахароза) - 149,8 мг, крахмал картофельный - 29,4 мг, тальк - 4,8 мг, кальция стеарат-2,0 мг.

Описание: таблетки круглые, двояковыпуклые светло- коричневого цвета с вкраплениями от почти белого до темно-коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа:

Седативное средство растительного происхождения.

Код АТХ: [N05CM]

Фармакологические свойства:

Оказывает успокаивающее действие, снижает частоту и увеличивает силу сердечных сокращений, проявляет гипотензивные свойства. По характеру действия близок к препаратам валерианы.

Показания к применению

Повышенная нервная возбудимость, неврастения, бессонница, нейроциркуляторная дистония.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, наследственная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахаразы-изомальтазы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазу обострения, беременность, период кормления грудью, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата в период беременности противопоказано. При необходимости применения препарата в период лактации, следует прекратить грудное вскармливание.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 3-4 раза в день. Курс лечения подбирают индивидуально с учетом течения заболевания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, диспепсия.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. При превышении рекомендуемых доз возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Совместим с другими седативными и кардиологическими препаратами; усиливает действие снотворных и анальгезирующих средств.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

В период лечения следует соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки по 14 мг. По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке.

По 2, 3, 4, 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного.

Контурные ячейковые упаковки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

Контурные ячейковые упаковки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку «Для стационаров».

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Наименование и адрес предприятия-производителя/ организация, принимающая претензии:

ОАО "Фармстандарт-Лексредства",

305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru