

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата  
**ГЛЮКОЗА**

**Регистрационный номер:** ЛС-001742

**Торговое название препарата:** Глюкоза

**Международное непатентованное название:** Декстроза

**Лекарственная форма:** таблетки

**Состав**

*Активные вещества:* декстрозы моногидрат – 500 мг;

*Вспомогательные вещества:* тальк – 6 мг, стеариновая кислота – 4 мг.

**Описание**

Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрические, с фаской и риской.

**Фармакотерапевтическая группа:** средство углеводного питания.

**Код АТХ:** V06DC01

**Фармакологические свойства**

Благодаря участию в различных процессах обмена веществ глюкоза оказывает многообразное действие на организм: усиливает окислительно-восстановительные процессы, улучшает антитоксическую функцию печени, поступая в ткани, фосфорилируется, превращаясь в глюкозо-6-фосфат, который активно включается во многие звенья обмена веществ организма, являясь источником ценного легкоусваиваемого питательного вещества. При метаболизме глюкозы в тканях выделяется значительное количество энергии, необходимой для жизнедеятельности организма.

**Показания к применению**

Гипогликемия, недостаточность углеводного питания.

**Противопоказания**

Сахарный диабет (кроме случаев гипогликемии).

**Способ применения и дозы**

Таблетки принимают внутрь по 0,5 - 2,5 - 5 г (1 - 10 таблеток) на прием, таблетки можно разламывать, разжевывать или рассасывать. При необходимости доза может быть увеличена. Повторный прием возможен с учетом массы тела, не превышая дозы 0,3 г/кг/час. Принимать таблетки следует за 1 – 1,5 часа до еды из-за возможного снижения аппетита после приема глюкозы.

**Побочное действие**

Снижение аппетита, гипергликемия (при сахарном диабете или передозировке).

**Особые указания**

Таблетки глюкозы являются источником легкодоступного питательного вещества, однако, не являются полноценным заменителем сбалансированного питания.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно по показаниям. Необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами**

Данные о влиянии препарата на способность к управлению транспортными средствами и выполнение других потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, отсутствуют.

### **Форма выпуска**

*при производстве на ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм", Россия:*

Таблетки по 0,5 г. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку.

По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку.

Контурные ячейковые или безъячейковые упаковки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

1, 2, 5 или 10 контурных ячейковых или безъячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

*или*

*при производстве на ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия:*

Таблетки по 0,5 г. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку.

Контурные ячейковые упаковки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

1, 2, 5 или 10 контурных ячейковых или безъячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Срок годности**

5 лет. Не применять позже срока, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Наименование и адрес предприятия-производителя/организация, принимающая претензии:**

*при производстве на ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм":*

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм",

634009, Россия, г. Томск, пр. Ленина, д. 211, тел./факс: (3822) 40-28-56, [www.pharmstd.ru](http://www.pharmstd.ru)

*или*

*при производстве на ОАО "Фармстандарт-Лексредства":*

ОАО "Фармстандарт-Лексредства",

305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13, [www.pharmstd.ru](http://www.pharmstd.ru)