

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ревит

**Регистрационный номер:** Р N001148/01

**Торговое наименование:** Ревит

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Поливитамины

**Лекарственная форма:** драже

**Состав на одно драже**

*Действующие вещества:*

Ретинола пальмитат (витамин А) - 1,38 мг (2500 МЕ)

*(в виде раствора, содержащего ретинола пальмитат  
в подсолнечном масле - 2500 МЕ, стабилизированного  
бутилгидрокситолуолом - 0,025 мг)*

Тиамин гидрохлорид (витамин В<sub>1</sub>) - 1,00 мг

Рибофлавин (витамин В<sub>2</sub>) - 1,00 мг

Аскорбиновая кислота (витамин С) - 35,00 мг

*Вспомогательные вещества:* сахароза - 411,750 мг, мука пшеничная - 23,596 мг, патока крахмальная - 25,760 мг, воск пчелиный - 0,074 мг, тальк - 0,288 мг, подсолнечное масло - 0,102 мг, ароматизатор апельсиновый - 0,050 мг.

**Описание:** драже желто-оранжевого цвета правильной шарообразной формы со слабым характерным запахом. Поверхность драже должна быть ровной, гладкой, однородной по окраске.

**Фармакотерапевтическая группа:** поливитаминное средство

**Код АТХ:** А11ВА

**Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат, действие которого определяется свойствами витаминов, входящих в его состав.

Ретинол (*витамин А*) – необходим для нормального течения метаболических процессов, в том числе для регуляции роста и развития организма. Обеспечивает нормальную функцию

органа зрения, структурную целостность тканей, повышает резистентность организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.

Тиамин (*витамин В<sub>1</sub>*) – необходим для нормального функционирования нервной системы, пищеварительного тракта, сердечной деятельности и эндокринных желез. Оказывает умеренно выраженное ганглиоблокирующее и курареподобное действие, положительно влияет на проведение нервных импульсов в синапсах.

Рибофлавин (*витамин В<sub>2</sub>*) – обладает анаболическим действием, улучшает течение окислительно-восстановительных процессов, нормализует холестеринновый обмен, усиливает синтез гемоглобина, улучшает зрение.

Аскорбиновая кислота (*витамин С*) – играет важную роль в регулировании окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей; участвует в синтезе глюкокортикостероидов, коллагена и проколлагена; нормализует проницаемость капилляров, способствует повышению сопротивляемости организма инфекциям.

### **Показания к применению**

В качестве профилактического средства у детей и взрослых при состояниях, сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах А, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub> и С (период интенсивного роста, повышенная физическая или умственная нагрузка, при несбалансированном или неполноценном питании); в комплексной терапии в период выздоровления после перенесенных заболеваний.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчнокаменная болезнь, хронический панкреатит, гипервитаминоз А, детский возраст до 3-х лет.

### **С осторожностью**

Сахарный диабет.

Перед началом лечения проконсультируйтесь с врачом.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Рекомендовано принимать внутрь, по назначению врача.

При беременности и в период грудного вскармливания принимать по 1 драже в день.

### **Способ применения и дозы**

Ревит принимают внутрь через 10-15 минут после еды. Взрослым по 1 драже 3 раза в день. Детям с 3 до 7 лет по 1-2 драже в день, от 7 до 15 лет по 1 драже 2-3 раза в день. Курс лечения 30-60 дней. Курс лечения по рекомендации врача может быть повторен после перерыва (1-3 месяца).

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

### **Передозировка**

Длительное применение очень больших доз Ревита может вызывать гипервитаминоз А (боли в животе, задержки менструации, увеличение печени и селезенки, желудочно-кишечные расстройства, запоры, выпадение волос, зуд, суставные боли, тошнота, рвота, мелкие трещины на губах и уголках рта, сухость кожи).

Лечение: прекращение приема препарата, обильное питье, дезинтоксикационная инфузионная терапия. Лечение в домашних условиях или в стационаре назначает врач.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Входящая в состав препарата аскорбиновая кислота может повышать всасывание пенициллина, железа, уменьшать действие гепарина и непрямых антикоагулянтов, увеличивать риск кристаллурии при лечении салицилатами. Всасывание ретинола нарушают нитриты и холестирамин. Тиамин, влияя на процессы поляризации в области нервно-мышечных синапсов, может ослаблять курареподобное действие.

*Если Вы принимаете какие-либо другие лекарственные препараты, проконсультируйтесь с врачом о возможности применения и дозы препарата.*

### **Особые указания**

Возможно, окрашивание мочи в желтый цвет (совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина).

Не принимать одновременно с другими витаминными препаратами во избежание передозировки.

Не превышать рекомендованной суточной дозы, при случайном приеме высоких доз следует немедленно обратиться к врачу.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Драже.

По 100 драже в банки полимерные. Банки полимерные укупоривают крышками навинчиваемыми. Каждую банку полимерную помещают в пачку из картона вместе с инструкцией по применению или 32 банки полимерные вместе с соответствующим количеством инструкций по применению помещают в термоусадочную пленку.

### **Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

1 год.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

### **Производитель/организация, принимающая претензии потребителей**

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», 450077, Россия, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28, телефон/факс: (347) 272 92 85,

[www.pharmstd.ru](http://www.pharmstd.ru)

Представитель

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»

Е.В. Толстова