

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ИНГАЛИПТ

Регистрационное удостоверение:**Торговое название препарата:** Ингалипт**Лекарственная форма:** аэрозоль для местного применения**Состав на один баллон***Активные вещества:* сульфаниламид натрия - 0,750 г, сульфатиазола натрия пентагидрат - 0,750 г, тимол - 0,015 г, масло эвкалиптовое - 0,015 г, мяты перечной масло - 0,015 г.*Вспомогательные вещества:* этанол (спирт этиловый) 95 % - 1,800 г, сахаринат натрия - 0,045 г, глицерол (глицерин) - 2,100 г, полисорбат-80 (твин-80) - 0,900 г, вода очищенная - до 30 мл, азот - от 0,3 до 0,4 г.**Описание**

Прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, находящаяся в баллоне с клапаном непрерывного действия под давлением сжатого газа. Препарат при выходе из баллона образует струю с характерным запахом тимолола и ментола.

Фармакотерапевтическая группа: противомикробное комбинированное средство**Код АТХ:** [R02AA20]**Фармакологическое действие**

Комбинированный препарат для местного применения при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и горла. Входящие в состав препарата растворимые сульфаниламиды оказывают противомикробное действие (в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и горла). Тимол, масло эвкалиптовое и мяты перечной масло оказывают противогрибковый (в отношении грибов рода *Candida*), противомикробный, противовоспалительный и легкий обезболивающий эффект.

Показания к применению

Тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный стоматит.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата; беременность, лактация; детский возраст до 3 лет.

Способ применения и дозы

Применяется местно. Сняв предохранительный колпачок с баллона, распыляют взвесь в полость рта 1-2 секунды. Орошение проводится 3-4 раза в сутки с предварительным прополаскиванием рта кипяченой водой.


Побочное действие

Аллергические реакции, кратковременное ощущение жжения или першения в горле.

Передозировка

Признаки острого отравления при приеме внутрь: тошнота, рвота, боли в желудке. Пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу.

Меры помощи при передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка, искусственная рвота, использование солевых слабительных, клизма, применение кишечных адсорбентов – активированного угля), симптоматическое лечение. При необходимости проводят оксигено- и трансфузионную терапию.




Особые указания

Дети могут применять препарат с такого возраста, когда они не сопротивляются постороннему предмету (аппликатору) во рту при применении аэрозоля и способны задерживать дыхание при впрыскивании препарата.

Баллон не вскрывать и не нагревать.

Во время введения препарата баллон следует держать вертикально (см. рисунок)!

**Форма выпуска**

Аэрозоль для местного применения.

По 30 мл в баллоны аэрозольные алюминиевые моноблочные, снабженные клапанами непрерывного действия и предохранительными колпачками. Каждый баллон с распылителем и инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре от 3 °С до 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Наименование и адрес изготовителя/организация, принимающая претензии:

ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18.

Тел./факс: (4712) 34-03-13

Представитель

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

Е.В. Толстова

И.о. директора ИДКЭЛС

А.Н. Васильев

